

CUESTIONARIO DE CLÍNICA DE VACUNAS



Información-Dueño

P _____

Apellido _____ Nombre _____ Fecha _____

Dirección _____ Ciudad _____ Estado _____ Zip _____

No. Telefónico _____ Dirección de correo electrónico _____

INFORMACION DE MASCOTA (Favor de circular)

A _____

PERRO GATO MACHO HEMBRA Esterilizada(o)

Nombre de la mascota _____ Edad _____ (Años o Meses)

Raza _____ Color/Marcas _____

1. Esta su mascota tomando medicamentos? SI NO Cual? _____
2. Ha tenido su mascota reacciones alérgicas a, Vacunas, picadas de insecto o medicamentos? SI NO Cuando? _____
3. Esta su mascota embarazada o lactando? SI NO Cuando? _____
4. En el mes pasado, ha tenido su mascota alguno de los siguientes: Tos, estornudo, Diarrea, Vomito, Falta de Apetito SI NO Cuando? _____

VACUNAS DESEADAS (Si no está seguro, déjelo blanco)

PERROS

- Nobivac DAPPV - \$25.00
- Bordetella - \$12.00
- Rabia - \$12.00
- Influenza Canina H3N2 - \$20.00
- Desparasitante (pyrantel pamoate) - \$5.00
- Microchip - \$25.00

GATOS

- Nobivac FRCPC - \$15.00
- FeLV - \$15.00
- Rabia - \$12.00
- Desparasitante (pyrantel pamoate) - \$5.00
- Microchip - \$25.00

OFFICE USE ONLY

TEMP: _____ HR: _____ RR: _____ MM: _____ Hydration Status: _____ Weight (if needed): _____

1. General: N NE A _____
2. Cardiovascular: N NE A _____
3. Respiratory: N NE A _____
4. Integument: N NE A _____
5. Musculoskeletal: N NE A _____

N= Normal, NE= Not examined, A= Abnormal

- Appears healthy for vaccination
- Limited physical exam at this time

Administrated by: _____

Comments:

Recommendations:

- Booster Vaccines
- Spay/Neuter
- Other _____

Vaccine History

DOGS

DAPPV _____
Bordetella _____ Rabies _____

CATS

FRCPC _____
FeLV _____ Rabies _____

NEEDS SCHEDULE (check here)

NEEDS SCHEDULE (check here)

CUESTIONARIO DE CLÍNICA DE VACUNAS



VACUNAS PARA PERROS

Nobivac DAPPV (Moquillo, Adenovirus (I, II), parvovirus, virus de la parainfluenza): Nobivac® Canine 1-DAPPV es una vacuna de virus vivos modificados para la vacunación de perros sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad causada por el virus del moquillo canino, el adenovirus tipo 1 (hepatitis) y el adenovirus tipo 2 (enfermedad respiratoria), parainfluenza canina y parvovirus canino. La dosis inicial se puede administrar a las 6 semanas o más. Repita a intervalos de 3 a 4 semanas hasta que el perro tenga 16 semanas de edad. Se recomienda la revacunación anual con una dosis.

Bordetella (tos canina): Se recomienda la vacuna Bordetella como ayuda en la prevención de enfermedades asociadas con el adenovirus canino tipo 2, el virus de la parainfluenza canina y la infección por Bordetella bronchiseptica. Se ha implicado que estos agentes desempeñan un papel en la etiología de la afección conocida como tos canina. La dosis inicial se puede administrar a las 6 semanas. Se recomienda la revacunación anual con una dosis.

Nobivac® Canine Flu H3N2: Esta vacuna ha demostrado ser eficaz para la vacunación de perros sanos de 8 semanas de edad o más contra la enfermedad causada por la cepa H3N2 del virus de la influenza canina. Una segunda dosis se administra 2 a 4 semanas después. Se requiere un mínimo de dos dosis para la inmunización primaria.

Rabia: La vacuna contra la rabia es para la vacunación de perros y gatos sanos y ayuda para prevenir la rabia. Los perros y gatos deben tener al menos 12 semanas de edad para la vacunación inicial. Las mascotas sin historial de vacunación o las que reciben la vacuna por primera vez recibirán una vacuna de 1 año. Revacunación posterior cada 3 años con una sola dosis. La vacunación contra la rabia es requerida por la ley.

VACUNAS PARA GATOS

FRCPC (rinotraqueitis vírica felina, el calicivirus, panleucopenia, clamidia): La vacuna FRCPC de Nobivac® es una vacuna contra el virus vivo y la clamidia modificada para la vacunación de gatos sanos de 9 semanas o más como ayuda en la prevención de enfermedades causadas por la rinotraqueitis felina, los virus calici y panleucopenia y chlamydia psittaci. Vacunación inicial a las 9 semanas de edad. La segunda vacunación se recomienda de 3 a 4 semanas después de la vacunación inicial hasta las 16 semanas de edad. Se recomienda la revacunación anual con una dosis.

FelV (virus de leucemia felina): La vacuna 2-FelV de Nobivac® se recomienda para la vacunación de gatos de 9 semanas de edad o más como ayuda en la prevención de tumores linfoides causados por, y enfermedades asociadas con la infección por el virus de la leucemia felina (FelV). La vacunación con este producto previene la viremia persistente en gatos expuestos al virus de la leucemia felina. Se requieren dos dosis para la inmunización primaria, 3 a 4 semanas después de la vacunación inicial. Vacuna anual.

Rabia: Requerido por la ley (véase la rabia bajo Vacunas para perros más arriba).

Yo, el dueño de la mascota, o agente de la misma, confirman que toda la información que he indicado en este formulario es correcta y verdadera a lo mejor de mi conocimiento. He leído y entendido la hoja de la clínica de vacunas que me dieron antes de completar este formulario. Por la presente, libero a Animal Foundation y a todos sus empleados de todos y cada uno de los reclamos que surjan o estén relacionados con el rendimiento de la (s) vacuna (s) seleccionada (s) o cualquier reacción adversa de las vacunas. Acepto que no he reclamado ni reclamaré ningún derecho de compensación de Animal Foundation.

Firma Del Cliente _____

La Fundación Animal es un refugio sin fines de lucro que proporciona refugio para animales sin hogar en Las Vegas.
Para ayudar a los miles de animales sin hogar que llegan a The Animal Foundation cada año,
Me gustaría hacer una donación de:

\$1 \$5 \$10 \$20 Otra cantidad: _____ NO